Échelles pronostiques discutées dans le podcast #4

Source : Claribel et al., « Prognostic Tools in Patients With Advanced Cancer : A Systematic Review », *Journal of Pain and Symptom Management*, Vol. 53, No. 5, May 2017, Appendix II.

Palliative Prognostic Score (PaP)

Critère	**Points**
Dyspnée	1
Anorexie	1
Karnofsky Performance Score Plus de 30 10-20	 0 2.5
Survie prédite par le clinicien Plus de 12 semaines 11-12 7-10 5-6 3-4 1-2	 0 2 2.5 4.5 6 8.5
Globules blancs totaux (x 10^9) Normal (moins de 8,5) Élevés (8,6-11) Très élevés (plus de 11)	 0 0,5 1,5

Pour échelle modifiée D-Pap, ajouter 2 points si présence de délirium

Probabilité de survie à 30 jours :

PaP

Plus de 70%	0-5.5
30-70%	5.6-11
Moins de 30%	11,1-17,2

D-Pap

Plus de 70%	0-7
30-70%	7,1-12,5
Moins de 30%	12,6-19,5

Palliative Prognostic Index (PPI)

Critère	Points
PPS 10-20 30-50 60 ou plus	 4 2,5 0
Apports per os Sévèrement réduits Modérément réduits Normaux	 2,5 1 0
Œdème Présent Absent	 1 0
Dyspnée au repos Présente Absente	 3,5 0
Délirium Présent Absent	 4 0

Survie en fonction du score :

4 ou plus : plus de 6 semaines

5 ou 6 : moins de 6 semaines

Plus de 6 : moins de 3 semaines

Glasgow Prognostic Score (GPS)

Protéine C réactive (mg/L)	Albumine (g/L)	Score
≤ 10	≥ 35	0
> 10	Normale	1
Normale	< 35	1
> 10	< 35	2

Modified Glasgow Prognostic Score (mGPS)

Protéine C réactive (mg/L)	Albumine (g/L)	Score
≤ 10	≥ 35	0
> 10	Normale	1
> 10	< 35	2

Palliative Performance Scale (PPS): se référer au Mini-guide Palli-Science pour les critères

Survie médiane en fonction du PPS selon Jang et al., « Simple Prognostic Model for Patients With Advanced Cancer Based on Performance Status », *J Oncol Pract* 2014, Sept; 10(5). e335-41.

PPS	**Survie médiane (jours)**
80-100	221
60-70	115
40-50	51
10-30	22